


Uitlegkaart voor het geven van Tardyneo 20 mg/ml drank (IJzer)

Voor kinderen van 6 tot 24 maanden oud


Om het risico kleiner te maken op verstikking bij het geven van dit medicijn met de doseerpipet, is het belangrijk dat u alle beschreven stappen voor het geven van het medicijn volgt:
Geef dit medicijn een tijdje voor of na maaltijden en producten gemaakt met melk.



1) Trek de drank op met de doseerpipet tot het maatstreepje dat het dichtstbij de geadviseerde dosering ligt (maatstreepje elke 5 milligram). Gebruik niets anders dan de doseerpipet die in de doos zit.



2) Pak uw kind op **terwijl het wakker is. Houd uw kind in een halfzittende positie in de holte van uw arm**, met het hoofdje op uw arm.



3) Houd de pipet met de oplossing vast en breng deze ongeveer 1 centimeter in de mond van uw baby, **tegen de binnenkant van de wang. Druk heel langzaam op de zuiger van de pipet** zodat het medicijn druppel voor druppel in de mond komt.

Let op: leg uw baby niet meteen neer nadat u dit medicijn heeft gegeven.

Er bestaat een risico op verstikking bij het geven van dit medicijn aan uw baby. Hierbij kan de vloeistof per ongeluk in de luchtwegen van uw baby komen. Als u de volgende klachten merkt: **hoesten, ongemak, bleke kleur van de huid, blauwachtige lippen, tenen of vingers, moeite met ademen of stoppen met ademen (apneu), weinig beweging, verlies van energie of rusteloos zijn,**

houd uw kind in een zittende houding en neem direct contact op met de hulpdiensten. Bel direct 112.

De hulpdiensten zullen u vertellen wat u moet doen om uw kind direct te helpen.

De doseerpipet die wordt gebruikt voor het geven van het medicijn moet na gebruik worden gespoeld. Laat drogen en berg op in de doos.

Merkt u een bijwerking bij uw baby terwijl uw baby dit medicijn krijgt? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. U kunt bijwerkingen ook melden via de volgende website:
www.eenbijwerkingmelden.be (België) en www.lareb.nl (Nederland).